

РНК-препарат

ВИТАЛАНГ-2®

Пер. уд-е №: 35-3-15.19-4552 № ПВР-3-15.19/03504

Виталанг-2® – препарат иммуномодулирующего действия для лечения и профилактики вирусных заболеваний свиней, в том числе находящихся в латентной форме.

- Индуктор интерферонов на основе амфифильной высокополимерной дрожжевой РНК
- Совместим со всеми лекарственными средствами
- Является адъювантом при вакцинации
- Не имеет побочных эффектов
- Нет противопоказаний

Виталанг-2® обладает способностью активизировать образование эндогенных интерферонов, подавляющих репродукцию вирусов на внутриклеточном уровне, индуцирует лейкоцитарную реакцию, дозозависимо стимулирует первичный (IgM) и вторичный (IgG) гуморальный иммунный ответ, проявляет иммуoadъювантные свойства при совместном использовании с антибактериальными и противовирусными вакцинами.

Как следствие, значительно повышает неспецифическую резистентность организма животных в отношении возбудителей вирусных инфекционных болезней.

Виталанг-2® выпускается в форме лиофилизата для приготовления водного раствора из расчета 25 мг препарата (1 флакон) на 2 мл воды. Приготовленный раствор может храниться в холодильнике не более 24 часов. Для более длительного хранения препарат можно замораживать.

Виталанг-2® применяют интраназально путём впрыскивания или закапывания водного раствора в носовые проходы.



Сколково

Тел: 8-913-739-69-24,
8-960-784-75-88

виталанг.пф | vitalang-2@mail.ru | vk.com/vitalang





ПОКАЗАНИЯ.

Виталанг-2® применяют молодняку сельскохозяйственных животных с целью повышения резистентности организма, повышения эффективности вакцинации поросят против сальмонеллеза, для профилактики и лечения заболеваний: чума свиней, вирусные гастроэнтериты, грипп, ящур и пр.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лечения вирусных заболеваний Виталанг-2® применяют в течение 7-10 дней в дозе 0,5 мг/кг массы животного (при сильных проявлениях в первые два дня двойную дозировку – 1 мг/кг массы животного).

Для повышения резистентности организма препарат вводят:

- поросятам-отъемышам в дозе 1 мг/кг массы животного в день отъема и через 7 дней;
- разово в дозе 1 мг/кг массы животного в преддверии критического периода (15-20 дни выращивания поросят). Возможно сочетанное применение с антибактериальной терапией.

Для повышения интенсивности и прироста массы тела:

- однократно в дозе 1 мг/кг массы тела.

Для повышения эффективности вакцинации

(позволяет повысить уровень антител в 2-3 раза):

- поросятам сосунам против сальмонеллеза Виталанг-2® вводят в дозе 1 мг/кг массы в день вакцинации и второй раз спустя 10 дней после неё в дозе 0,5 мг/кг массы.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Возможно применение препарата для лечения беременных животных. Продукты животноводства после применения Виталанга-2® используются в пищевых целях без ограничений.

