

РНК-препарат

Виталанг-2®

Пер. уд-е №: 35-3-15.19-4552 № ПВР-3-15.19/03504

Виталанг-2® – препарат иммуномодулирующего действия для лечения и профилактики вирусных заболеваний, в том числе находящихся в латентной форме.

- Индуктор интерферонов на основе амфифильной высокополимерной дрожжевой РНК
- Является адъювантом при вакцинации
- Не имеет побочных эффектов
- Нет противопоказаний
- Совместим со всеми лекарственными средствами

Виталанг-2® обладает способностью активизировать образование эндогенных интерферонов, подавляющих репродукцию вирусов на внутриклеточном уровне, индуцирует лейкоцитарную реакцию, дозозависимо стимулирует первичный (IgM) и вторичный (IgG) гуморальный иммунный ответ, проявляет иммуноадъювантные свойства при совместном использовании с антибактериальными и противовирусными вакцинами.

Как следствие, значительно повышает неспецифическую резистентность организма животных в отношении возбудителей вирусных инфекционных болезней.

Виталанг-2® выпускается в форме лиофилизата для приготовления водного раствора из расчета 25 мг препарата (1 флакон) на 2 мл воды. Приготовленный раствор может храниться в холодильнике не более 24 часов. Для более длительного хранения препарат можно замораживать.


Виталанг-2® применяют интраназально путём впрыскивания или закапывания водного раствора в носовые проходы.



Сколково

Тел: 8-913-739-69-24,
8-960-784-75-88

виталанг.пф | vitalang-2@mail.ru | vk.com/vitalang





Флакон с препаратом Виталанг-2® **вскрывают непосредственно перед применением** и растворяют в 2 мл физраствора комнатной температуры. **1 флакон с раствором рассчитан на 50 кг веса животного.**

На 1 кг веса животного необходимо 0,04 мл полученного раствора препарата. Фармацевтическая мера капли – 0,05 мл.

Для простоты использования препарата для мелких животных можно полученный раствор мерить просто в каплях. На 1 кг веса мелкого животного – 1 капля полученного раствора препарата.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяют при: короновиральном энтерите, ринотрахеите, калицивирозе и др. вирусных заболеваниях **кошек**; чуме плотоядных, парвовирусном энтерите, аденовирусных инфекциях (инфекционный гепатит и аденовироз или инфекционный ларинготрахеит) и некоторых др. заболеваниях **собак**.

Для лечения Виталанг-2® применяют в виде капель в нос 1 раз в сутки (преимущественно вечером) в течение 7-10 дней. На 1 кг веса животного – 1 капля раствора препарата. В случае тяжелого течения болезни в первые два дня лечения рекомендуем использовать двукратную дозировку препарата Виталанг-2®. В случае хронических инфекций рекомендуем повторить курс лечения через 7-10 дней.

Для профилактики заболеваний Виталанг-2® применяют из расчета 1 капля препарата на 1 кг веса животного двукратно с интервалом 3 дня. Для усиления иммунитета животного препарат Виталанг-2® применяют однократно за сутки до транспортировки, проведения выставок из расчета 1 капля раствора препарата на 1 кг веса животного.

Для повышения эффективности вакцинации (позволяет повысить уровень антител в 2-3 раза) Виталанг-2® применяют двукратно в дозе 1 капля раствора на 1 кг веса: первый раз одновременно с вакциной, второй раз в той же дозе (без вакцины) через 7 дней.



Виталанг-2® – препарат природного происхождения, неблагоприятных воздействий на организм в случаях его передозировки, выявлено не было.