

РНК-препарат

# Виталанг-2®

Пер. уд-е №: 35-3-15.19-4552 № ПВР-3-15.19/03504

**Виталанг-2®** – препарат иммуномодулирующего действия для лечения и профилактики вирусных заболеваний птицы, в том числе находящихся в латентной форме.

- Индуктор интерферонов на основе амфифильной высокополимерной дрожжевой РНК
- Совместим со всеми лекарственными средствами
- Является адъювантом при вакцинации
- Не имеет побочных эффектов
- Нет противопоказаний

**Виталанг-2®** обладает способностью активизировать образование эндогенных интерферонов, подавляющих репродукцию вирусов на внутриклеточном уровне, индуцирует лейкоцитарную реакцию, дозозависимо стимулирует первичный (IgM) и вторичный (IgG) гуморальный иммунный ответ, проявляет иммуноадъювантные свойства при совместном использовании с антибактериальными и противовирусными вакцинами. Как следствие, значительно повышает неспецифическую резистентность организма животных в отношении возбудителей вирусных инфекционных болезней.

Виталанг-2® выпускается в форме лиофилизата для приготовления водного раствора из расчета 25 мг препарата (1 флакон) на 2 мл воды. Приготовленный раствор может храниться в холодильнике не более 24 часов. Для более длительного хранения препарат можно замораживать.



Тел: 8-913-739-69-24,  
8-960-784-75-88

виталанг.пф | vitalang-2@mail.ru | vk.com/vitalang



## ПОКАЗАНИЯ:

Виталанг-2® применяют с целью повышения резистентности организма, повышения эффективности вакцинации, а также для профилактики и лечения вирусных заболеваний птицы: болезней Марека, Гамборо и Ньюкасла, гриппа, ринотрахеита, инфекционного бронхита, вирусного гастроэнтерита и др. заболеваний птицы.



## ДЛЯ УДОБСТВА ПРИВОДИМ РАСЧЕТ ПРЕПАРАТА:

- на 1000 голов суточных цыплят (~ 50 г) – 1 флакон препарата (25 мг).
- на 500 кг живого веса взрослой птицы – 1 упаковка препарата (250 мг).

Виталанг-2® применяют интраназально. Впрыскивание раствора лекарственного препарата производится при помощи распылителя любой системы (спреем, аэрозолем, «сухим туманом» и пр.).

## ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

**Для лечения** Виталанг-2® применяют, 1 раз в сутки в течение 7-10 дней.

**Для профилактики** заболеваний Виталанг-2® применяют двукратно с интервалом 3 дня.

**Для повышения эффективности вакцинации** (позволяет повысить уровень антител в 2-3 раза) применяют двукратно в день вакцинации и повторно через 7-10 дней.



## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Продукты птицеводства после применения Виталанга-2® используются в пищевых целях без ограничений.

Виталанг-2® – препарат природного происхождения, неблагоприятных воздействий на организм в случаях его передозировки выявлено не было.